

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado **Artific colirio en solución** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a un médico.

En este prospecto:

Qué es **Artific colirio en solución** y para qué se utiliza

Antes de usar **Artific colirio en solución**

Cómo usar **Artific colirio en solución**

Posibles efectos adversos

Conservación de **Artific colirio en solución**

## **Artific colirio en solución** **Hipromelosa**

Un ml de **Artific colirio en solución** contiene como principio activo 3,20 mg de hipromelosa (methocel F4M). Los demás componentes son: cetrimida, hidrógeno fosfato de sodio dodecahidrato, dihidrógeno fosfato de sodio dihidrato, edetato disódico, sorbitol, agua para inyección.

### **Titular:**

FARMA-LEPORI, S.A.

C. Osi, 7

08034 Barcelona. ESPAÑA

### **Responsable de la fabricación:**

DR. MANN PHARMA

Brunsbütteler Damm 173

13581 Berlin. ALEMANIA

### **1. QUÉ ES Artific colirio en solución Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

**Artific colirio en solución** se presenta en un frasco gotero de plástico de 10 ml.

**Artific** es un colirio en solución incoloro, transparente y sin partículas visibles, sustitutivo del fluido lagrimal. Puesto que se trata de un lubricante ocular, **Artific colirio en solución** está indicado en el tratamiento sintomático de la sequedad ocular.

### **2. ANTES DE USAR Artific colirio en solución**

#### **No use Artific colirio en solución**

Si usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes del producto.

#### **Tenga especial cuidado con Artific colirio en solución**

Los portadores de lentes de contacto blandas deberán extraérselas antes de la administración de **Artific colirio en solución** y esperar como mínimo 15 minutos para colocárselas de nuevo.

#### Embarazo y Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento. No existe experiencia respecto a la seguridad de este producto durante el embarazo o la lactancia.

#### Conducción y uso de máquinas

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducción o uso de maquinarias por el uso de **Artific colirio en solución**.

#### Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está usando, o ha usado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.  
En aplicación intraocular, no se han descrito, hasta la fecha, interacciones con otros medicamentos.

#### **CÓMO USAR Artific colirio en solución**

Recuerde usar su medicamento.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Si estima que la acción de **Artific colirio en solución** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

**Artific colirio en solución** es un colirio en solución que debe administrarse por vía oftálmica.

Normalmente usted debe instilarse una gota en el ojo de 3 a 5 veces al día o, si fuera necesario, más frecuentemente. El tratamiento del síndrome del ojo seco requiere un régimen individualizado de dosificación.

No usar después de transcurridas 6 semanas de la primera apertura del frasco.

#### **Si usted usa más Artific colirio en solución del que debiera**

Si usted ha utilizado más **Artific colirio en solución** de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

No se conocen efectos adversos por sobredosificación ocular y no se prevén efectos de sobredosis con la vía de administración oftálmica.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar con el Servicio de Información Toxicológica Teléfono 91 562 04 20.

#### **Si olvidó usar Artific colirio en solución**

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, **Artific colirio en solución** puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente puede producirse sensación de quemazón, visión borrosa y párpados pegajosos.

Si se observa cualquier otro efecto no descrito en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE Artific colirio en solución**

Mantenga **Artific colirio en solución** fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Conservar en el envase original.

#### Caducidad

No utilizar **Artific colirio en solución** después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido revisado en diciembre 2003



Farma-Lepori, S.A.  
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona

Con licencia de Dr. Mann Pharma, subsidiario de BAUSCH & LOMB