

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado **Artific colirio en solución unidosis** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a un médico.

En este prospecto:

1. Qué es **Artific colirio en solución unidosis** y para qué se utiliza
2. Antes de usar **Artific colirio en solución unidosis**
3. Cómo usar **Artific colirio en solución unidosis**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Artific colirio en solución unidosis**

### **Artific colirio en solución unidosis Hipromelosa**

Un ml de **Artific colirio en solución unidosis** contiene como principio activo 3,20 mg de hipromelosa (methocel F4M). Los demás componentes son: hidrógeno fosfato de sodio dodecahidrato, dihidrógeno fosfato de sodio dihidrato, sorbitol, agua para inyección.

#### **Titular:**

FARMA-LEPORI, S.A.  
C. Osi, 7  
08034 Barcelona. ESPAÑA

#### **Responsable de la fabricación:**

DR. MANN PHARMA  
Brunsbütteler Damm 173  
13581 Berlin. ALEMANIA

#### **1. QUÉ ES Artific colirio en solución unidosis Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

- Es una solución incolora, transparente y sin partículas, que se presenta en envases de 30 unidades unidosis de 0,5 ml.
- **Artific** pertenece al grupo de lágrimas artificiales y lubricantes oculares.
- Este medicamento está indicado en el tratamiento sintomático de la sequedad ocular.

#### **2. ANTES DE USAR Artific colirio en solución unidosis**

##### **No use Artific colirio en solución unidosis**

Si usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes del producto.

##### **Embarazo y Lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento. No existe experiencia respecto a la seguridad de este producto durante el embarazo o la lactancia.

##### **Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducción o uso de maquinarias por el uso de **Artific colirio en solución unidosis**.

##### **Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está usando, o ha usado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

En aplicación intraocular, no se han descrito, hasta la fecha, interacciones con otros medicamentos.

#### **3. CÓMO USAR Artific colirio en solución unidosis**

Recuerde usar su medicamento.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas:

Los portadores de **lentes de contacto blandas** no necesitan extraérselas antes de la administración de este medicamento.

1. Separar el colirio unidosis de la tablilla.
2. Girar el tapón

3. Instilar el colirio en el ojo colocando el envase perpendicularmente a éste.

Si estima que la acción de **Artific colirio en solución unidosis** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

**Artific colirio en solución unidosis** es un colirio en solución que debe administrarse por vía oftálmica.

Normalmente usted debe instilarse una gota en el ojo de 3 a 5 veces al día o, si fuera necesario, más frecuentemente. El tratamiento del síndrome del ojo seco requiere un régimen individualizado de dosificación.

**Artific colirio en solución unidosis** no tiene conservante y, por consiguiente, los portadores de **lentes de contacto blandas** no deberán extraérselas para su administración.

**Artific colirio en solución unidosis** no debe guardarse tras su apertura. Desechar el contenido restante del frasco unidosis después de cada aplicación.

#### **Si usted usa más Artific colirio en solución unidosis del que debiera**

Si usted ha utilizado más **Artific colirio en solución unidosis** de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

No se conocen efectos adversos por sobredosificación ocular y no se prevén efectos de sobredosis con la vía de administración oftálmica.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar con el Servicio de Información Toxicológica Teléfono 91 562 04 20.

#### **Si olvidó usar Artific colirio en solución unidosis**

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, **Artific colirio en solución unidosis** puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente puede producirse sensación de quemazón, visión borrosa y párpados pegajosos.

Si se observa cualquier otro efecto no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE Artific colirio en solución unidosis**

Mantenga **Artific colirio en solución unidosis** fuera del alcance y de la vista de los niños.

Después de su uso debe desecharse. No reutilizar.

No conservar a temperatura superior a 25°C.

#### **Caducidad**

No utilizar **Artific colirio en solución unidosis** después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**Este prospecto ha sido revisado en noviembre de 2004.**



FARMA-LEPORI  
C. Osi, 7 -9 08034 Barcelona

Con licencia de Dr. Mann Pharma, subsidiario de BAUSCH & LOMB