

## FOLHETO INFORMATIVO

### Nome do Medicamento

Dexamytrex Ophtiole

### Composição Qualitativa e Quantitativa

Substância Activa (1 ml colírio contem:)

Gentamicina Sulfato .....	5,0 mg
Dexametasona .....	1,0 mg
Dihidrogenofosfato, sal dissódico	
Cetrimida .....	0,05 mg

### Forma Farmacêutica

Colírio

### Categoria farmaco-terapêutica

XVI-1 Formas de aplicação tópica em Oftalmologia

### Nome ou designação do responsável pela A.I.M

L.Lepori, Lda

R. João Chagas, nº 53-3º Piso

1495-072 Algés

### Indicações Terapêuticas

Infecções do segmento anterior do olho causadas por gérmens patogénicos sensíveis à gentamicina, isto é, inflamações bacterianas da conjuntiva, córnea - sem lesão epitelial - e palpebras que mostrem reacções inflamatórias severas.

Inflamações alérgicas super infectadas da conjuntiva e palpebra.

### Contra-Indicações e Efeitos Secundários

Doenças purulentas agudas do segmento anterior do olho; herpes "corneae superficialis" lesões e processos ulcerosos da córnea; tuberculose ocular; infecções fúngicas do olho; glaucoma de ângulo aberto ou fechado; hipersensibilidade à dexametasona e/ou

gentamicina. Glaucoma e catarata em utilização prolongada. Em casos raros pode surgir sensação de picada de curta duração.

### **Interações Medicamentosas e Outras**

Não se conhecem

### **Precauções Especiais de Utilização**

Nada a referir

### **Efeitos em grávidas, lactentes, crianças, idosos e doentes com patologias especiais**

Por não existirem estudos na gravidez este produto não deverá ser utilizado nesta situação.

### **Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas**

Mesmo quando utilizado na indicação correcta, este medicamento influencia a capacidade visual; os condutores deverão ter particular cuidado na sua utilização.

### **Lista dos Excipientes**

Monohidrogenofosfato de sódio, Dihidrogenofosfato de potássio, Glicerol, Dissulfito de sódio, Polivinilpirrolidona, Hidroxipropilmetilcelulose, Edetato de sódio (Titrplex III), Solução de hidróxido de sódio 1N para ajuste de pH, Ácido Clorídrico 1N para ajuste de pH, água destilada.

### **Posologia e Modo de Administração**

Em geral, instilar no olho doente, 1 gota de colírio no saco conjuntival, 4 a 6 vezes ao dia.

### **Indicação do Momento mais Favorável à Administração do Medicamento**

Consultar o seu médico.

### **Duração do Tratamento Médio**

A duração do tratamento não deverá exceder 2 semanas; durante o tratamento deverão ser observados os resultados; é recomendada a vigilância da pressão intraocular.

### **Advertências**

Se for omitida a administração de uma ou mais doses o tratamento deve continuar.

Não é necessária qualquer precaução especial para a suspensão do tratamento, nem são

de considerar casos de sobredosagem.

Se verificar algum efeito secundário que não conste da respectiva rubrica deste folheto deve comunicá-lo ao seu médico ou ao farmacêutico.

Verifique se o produto se encontra dentro do prazo de validade inscrito na embalagem.

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C. Proteger o frasco do colírio da luz, colocando-o sempre dentro da cartonagem após cada aplicação.

Mantenha sempre todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

**Ultima Revisão**

Fevereiro 2004