

FOLHETO INFORMATIVO

Nome do Medicamento

Dexamytrex

Composição Qualitativa e Quantitativa

Substância Activa (1 g de pomada contem:)

Gentamicina Sulfato ...	5,0 mg
Dexametasona ...	0,3 mg
Dihidrogenofosfato, sal dissódico	
Clorobutanol hemihidratado como conservante...	3,1 mg

Forma Farmacêutica

Pomada Oftalmica

Categoria farmaco-terapêutica

XVI-1 Formas de aplicação tópica em Oftalmologia

Nome ou designação do responsável pela A.I.M

L.Lepori, Lda

R. João Chagas, nº 53-3º Piso

1495-072 Alges

Indicações Terapêuticas

Infecções do segmento anterior do olho causadas por gérmens patogénicos sensíveis à gentamicina, isto é, inflamações bacterianas da conjuntiva, córnea - sem lesão epitelial - e palpebras que mostrem reacções inflamatórias severas.

Inflamações alérgicas super infectadas da conjuntiva e palpebra.

Contra-Indicações e Efeitos Secundários

Doenças purulentas agudas do segmento anterior do olho; herpes "corneae superficialis" lesões e processos ulcerosos da córnea; tuberculose ocular; infecções fúngicas do olho; glaucoma de angulo aberto ou fechado; hipersensibilidade à dexametasona e/ou gentamicina. Glaucoma e catarata em utilização prolongada. Em casos raros pode surgir

sensação de picada de curta duração.

Interações Medicamentosas e Outras

Não se conhecem

Precauções Especiais de Utilização

Manter fora do alcance das crianças.

O produto não deve ser usado após, o prazo de validade (Ver cartonagem e rotulo).

Efeitos em grávidas, lactentes, crianças, idosos e doentes com patologias especiais

Por não existirem estudos na gravidez este produto não deverá ser utilizado nesta situação.

Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas

Mesmo quando utilizado na indicação correcta, este medicamento influencia a capacidade visual; os condutores deverão ter particular cuidado na sua utilização.

Lista dos Excipientes

Alcool mirístico, Lanolina, Parafina líquida, Vaselina branca, α -Tocopherol, Oxydex

Posologia e Modo de Administração

Salvo outra prescrição, aplicar uma faixa de \approx 5 mm de pomada no saco conjuntival, 2-3 vezes ao dia e ao deitar.

Indicação do Momento mais Favorável à Administração do Medicamento

Consultar o seu médico.

Duração do Tratamento Médio

A duração do tratamento não deverá exceder 2 semanas; durante o tratamento deverão ser observados os resultados; é recomendada a vigilância da pressão intraocular.

Advertências

Se for omitida a administração de uma ou mais doses o tratamento deve continuar.

Não é necessária qualquer precaução especial para a suspensão do tratamento, nem são de considerar casos de sobredosagem.

Se verificar algum efeito secundário que não conste da respectiva rubrica deste folheto deve comunicá-lo ao seu médico ou ao farmacêutico.

Verifique se o produto se encontra dentro do prazo de validade inscrito na embalagem.

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C.

Mantenha sempre todos os medicamentos fora do alcance das crianças.

Última Revisão

Fevereiro de 2004