

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.**

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto se explica:**

1. Qué es **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** y para qué se utiliza
2. Antes de usar **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis**
3. Cómo usar **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis**

## **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis**

### **Diclofenaco sódico**

El principio activo es diclofenaco (DOE) sódico. Cada ml de colirio en solución contiene 1 mg de este principio activo.

Los demás componentes son aceite de ricino 35 polioxietilenado, L-lisina monohidrato, ácido bórico (E-284), bórax (E-285), cloruro de sodio, edetato de disodio, agua para preparaciones inyectables.

**Titular:** FARMA-LEPORI, S.A. C Osi, 7 - 08034 Barcelona (España)

**Responsable de la fabricación:** SIFI Phramaceuticals. Via Ercole Patti, 36. 95020 Aci S. Antonio (CT) (Italia)

### **1. QUÉ ES Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Este colirio se presenta en estuches que contienen 30 envases monodosis con 0,3 ml de colirio en solución. Este medicamento está incluido en el grupo de especialidades oftalmológicas tópicas.

Está indicado para:

- Tratamiento postoperatorio de la inflamación del segmento anterior del ojo.
- Tratamiento de inhibición de la miosis per y postoperatorio de cataratas.
- Tratamiento sintomático de las conjuntivitis crónicas no infecciosas.
- Tratamiento de la inflamación ocular, del dolor ocular y fotofobia post cirugía refractiva.

### **2. Antes de usar Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis**

**No use Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis:**

- Si usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes del producto.
- En niños menores de 3 años.

**Tenga especial cuidado con Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis, ya que:**

- En caso de infección o cuando exista riesgo de ésta, usted debe consultar a su médico, que podrá prescribir **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** conjuntamente con otro tratamiento apropiado (por ejemplo, antibióticos)
- Los AINE (antiinflamatorios no esteroideos) pueden enmascarar un proceso infeccioso agudo.

**Embarazo:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Aunque no se hayan detectado anomalías en el desarrollo fetal es aconsejable utilizar el producto sólo en casos de absoluta necesidad y bajo estricto control médico.

**Lactancia:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. A pesar de no haberse descrito ningún efecto como consecuencia de su aplicación, no se aconseja su uso.

**Conducción y uso de máquinas:**

Es aconsejable evitar ponerse el producto durante la conducción de vehículos o el uso de maquinaria.

**Información importante sobre algunos de los componentes de Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis:**

Por contener ácido bórico y borato sódico como excipientes, está contraindicado en niños menores de 3 años.

**Uso de otros medicamentos:**

En aplicación intraocular no se han descrito, hasta la fecha, interacciones con otros fármacos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

**3. CÓMO USAR Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas:

1. Separe un envase monodosis ejerciendo un movimiento de arriba hacia abajo, tirando de él.
2. Golpee ligeramente la base del envase monodosis con la punta del dedo para que el colirio baje hacia la apertura.
3. Gire el tapón con delicadeza. El colirio ya está abierto.
4. Instile el colirio en solución en el ojo y presione su base repetidamente para facilitar el descenso del líquido, que puede estar dificultado por las burbujas de aire.

Recuerde usar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis**. No suspenda el tratamiento antes de lo indicado.

La dosificación correcta para los casos indicados a continuación es la siguiente:

- Antes de la intervención quirúrgica: 1 gota de **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** 3-5 veces durante las 3 horas anteriores a la operación, lo que significa un máximo de 5 gotas.
- Después de la intervención quirúrgica: 3 gotas de **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** aplicadas a intervalos regulares de tiempo, comenzando inmediatamente después de la operación, seguida de 1-2 gotas de **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** 3-5 veces al día durante el período de tiempo requerido, lo que significa un máximo diario de 10 gotas.
- Otras indicaciones: 1-2 gotas de **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** 3-4 veces al día, según la gravedad del caso, lo que significa un máximo diario de 8 gotas.

Si estima que la acción de **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** es demasiado fuerte o débil, comuníquelo a su médico o farmacéutico.

**Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** debe utilizarse por vía oftálmica, es decir, debe ponérselo en los ojos.

**Si usted usa más Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis del que debiera:**

consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental acuda a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

**Si olvidó utilizar Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis:**

no se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

**4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente, como con otros colirios en solución de la misma clase terapéutica, se puede tener una leve o moderada sensación de escozor transitorio justo después de la instilación del colirio en solución. Raramente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad con prurito, enrojecimiento y fotosensibilidad.

Ante cualquier efecto adverso Usted deberá interrumpir la medicación. Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

## **5. CONSERVACIÓN DE Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis**

Mantenga **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** fuera del alcance y de la vista de los niños.

- No se precisan condiciones especiales de conservación.
- Conservar en el embalaje original.

Este medicamento no contiene conservantes. Después de su uso se debe desechar, aunque sólo se haya utilizado en parte.

### **Caducidad**

No utilizar **Diclofenaco-lepori colirio en solución monodosis** después de la fecha de caducidad indicada en la caja o en la etiqueta.

**Este prospecto ha sido aprobado:** diciembre 2004



FARMA-LEPORI  
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona