

## **ROSALGIN**

### **Bencidamina**

#### **Antiinflamatorio ginecológico**

**Rosalgin** está constituido por bencidamina (DCI) HCl sustancia de reconocida acción antiinflamatoria.

La bencidamina actúa sobre la inflamación respetando y facilitando la normal capacidad de defensa y de cicatrización de los tejidos, reduciendo el edema, la estasis capilar y las modificaciones degenerativas.

**Rosalgin** ejerce pues una efectiva acción detergente no sólo por el clásico efecto mecánico de los lavados vaginales, sino también por su acción inhibidora sobre la formación de material flogístico, ejerciendo una evidente acción antiexudativa.

#### **COMPOSICIÓN**

Cada sobre monodosis contiene:

bencidamina (DCI) HCl ..... 500 mg

Excipientes: tricetol, cloruro sódico, povidona K-25.

#### **INDICACIONES**

Vaginitis inespecíficas.

Coadyuvante en la terapia de las vaginitis específicas.

#### **POSOLOGÍA**

Se efectuarán según criterio médico 1 ó 2 irrigaciones vaginales o lavados externos al día.

Para la mejor realización de la ducha vaginal con **Rosalgin** se recomienda la utilización de **Rosalgin Equipo**.

#### **NORMAS DE ADMINISTRACIÓN**

La preparación de la solución se efectuará disolviendo el contenido de 2 sobres en 1 litro de agua. El agua podrá estar tibia.

#### **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**

No se han descrito.

#### **INCOMPATIBILIDADES**

No se conocen. Es perfectamente compatible con los antibióticos y antimicóticos utilizados en el tratamiento de las vaginitis infectadas, potenciando y acelerando su acción.

#### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

No se han descrito. La tolerancia local es buena no modificándose la flora vaginal normal, las células exfoliadas o el pH.

#### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de intoxicación por ingestión accidental, no existe tratamiento específico, debiendo procederse a lavado gástrico y a un tratamiento sintomático.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

**PRESENTACIÓN**

Caja con 10 sobres.

Caja con 20 sobres.

Envase clínico: caja con 200 sobres.

CON RECETA MÉDICA

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**



FARMA-LEPORI  
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona