

Rosalgin pronto

BENCIDAMINA CIH

Antiinflamatorio ginecológico

Rosalgin pronto tiene como principio activo la bencidamina CIH (DCI), substancia de reconocida acción antiinflamatoria. La bencidamina actúa sobre la inflamación respetando y facilitando la normal capacidad de defensa y de cicatrización de los tejidos, reduciendo el edema, la estasis capilar y las alteraciones degenerativas.

Rosalgin pronto ejerce pues una efectiva acción detergente no sólo por el clásico efecto mecánico de los lavados vaginales, sino también por su acción inhibidora sobre la formación de material flogístico, ejerciendo una evidente acción antiexudativa.

COMPOSICIÓN

Cada frasco monodosis de 140 ml contiene:

Bencidamina CIH (DCI) 140 mg

Excip.: tricetol; perfume Rosa rossa; agua purificada.

INDICACIONES

Vaginitis inespecíficas.

Coadyuvante en el tratamiento de las vaginitis específicas.

POSOLOGÍA

Se efectuarán según criterio médico 1 ó 2 irrigaciones vaginales al día.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Podrá utilizarse a temperatura ambiente o introduciendo el frasco cerrado durante algunos minutos en agua templada.

Para utilizar el aplicador monodosis debe efectuarse lo siguiente:

1º Para abrir el frasco mantener fijo el anillo superior, según la figura, y girar el capuchón hasta romper el precinto.

(Ver figura)

2º Extraer la cánula hasta notar el choque con la parte superior.

Sólo la extracción completa permitirá la salida del líquido.

3º Introducir delicadamente la cánula en la vagina y comprimir el frasco hasta vaciarlo.

El vaciamiento puede ser gradual y regulado según la necesidad, ya que una válvula incorporada impide el reflujo de la solución al frasco.

Para conseguir una actividad terapéutica plena, el líquido debe ser mantenido en la vagina durante algunos minutos.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

PRECAUCIONES

En caso de un tratamiento específico asociado, por la misma vía, **Rosalgin pronto** se administrará al principio, a fin de evitar la eliminación mecánica.

ADVERTENCIA

Este tratamiento no excluye otro tratamiento causal, si éste fuera necesario.

INCOMPATIBILIDADES

No se conocen. Es perfectamente compatible con los antibióticos y antimicóticos utilizados en el tratamiento de las vaginitis infecciosas, potenciando y acelerando su acción.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

PRESENTACIÓN

Caja con 5 frascos monodosis con 140 ml de solución.

CON RECETA MÉDICA

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



FARMA-LEPORI, S.A.
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona