

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar a tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto, puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda o no está seguro de alguna cosa, consulte a su médico o a su farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas, puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto:**

1. Qué es **Venolep** y para qué se utiliza
2. Antes de tomar **Venolep**
3. Cómo tomar **Venolep**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Venolep**

## **Venolep 200 mg, cápsulas**

### **Hidrosmina**

Cada cápsula contiene 200 mg de hidrosmina, como principio activo.

Los demás componentes son: estearato de magnesio como excipiente.

La cápsula de gelatina está compuesta de: gelatina, eritrosina (E127), amarillo anaranjado S (E110), amarillo de quinoleína (E104) y dióxido de titanio (E171).

Cada envase contiene 60 cápsulas.

**Titular:** FARMA-LEPORI, S.A. C. Osi, 7 - 08034 Barcelona

**Responsable de la fabricación:** FAES FARMA, S.A.. C/ Máximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco (Lejona) - Vizcaya

#### **1. QUÉ ES Venolep Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Hidrosmina es un fármaco de la familia química de los flavonoides que actúa sobre las consecuencias del estancamiento de sangre en las venas de las extremidades inferiores cuando éstas son incapaces de desarrollar su función, lo que llamamos insuficiencia venosa y que, generalmente, es debido a varices o antiguas trombosis.

**Venolep** se utiliza en el alivio a corto plazo (durante dos-tres meses) del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica (dolor, pesadez de piernas, hinchazón, etc.).

#### **2. ANTES DE TOMAR Venolep**

**Debería informar a su médico, ya que hay que tener especial cuidado en el uso de Venolep, si presenta algunas de las siguientes situaciones:**

- En alguna ocasión ha presentado una reacción de hipersensibilidad con este mismo medicamento o con alguno de los componentes del mismo.
- Padece o ha padecido asma o es alérgico a las aspirinas.

#### **Embarazo**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Debido a que no hay experiencia apropiada acerca de la seguridad de **Venolep** en el embarazo, se debe evitar su uso durante el mismo.

#### **Lactancia**

Se desconoce si hidrosmina se elimina por leche materna, por lo que no se recomienda su uso si usted está en período de lactancia.

#### **Toma o uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No se conocen interacciones con los alimentos ni con otros medicamentos, en todo caso nunca debe tomar otro medicamento por iniciativa propia sin que se lo haya recomendado su médico.

### **Advertencia sobre excipientes**

Este medicamento contiene amarillo anaranjado S (E110) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

### **3. CÓMO TOMAR Venolep**

Siga las recomendaciones de su médico sobre cuándo y cómo tomar este medicamento. Vía oral exclusivamente.

#### **Adultos:**

La dosis habitual de **Venolep** es de una cápsula de 200 mg tres veces al día, generalmente coincidiendo con las comidas principales.

### **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**

Una vez extraída del blíster, la cápsula se debe ingerir directamente. Se puede acompañar de agua u otra bebida para facilitar su deglución.

#### **Si Ud. ha tomado más Venolep del que debiera:**

En este caso consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20 o bien acuda a su médico.

### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Generalmente este medicamento es bien tolerado.

Las reacciones adversas que se han observado con mayor frecuencia son de tipo digestivo (dolor gástrico, náuseas), relacionadas con el sistema nervioso (mareos, dolor de cabeza) y de tipo dermatológico (erupción, picor).

Si observa alguna otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

### **5. CONSERVACIÓN DE Venolep**

No es necesaria ninguna medida especial de conservación.

#### **Caducidad**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**Mantenga Venolep fuera del alcance y de la vista de los niños**

**Este prospecto ha sido aprobado: febrero 2003**



FARMA-LEPORI, S.A.  
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona

Bajo licencia de FAES